



IDAI ALGAFER
FERTILIZANTE ÓRGANO-MINERAL
LÍQUIDO-CONCENTRADO SOLUBLE

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Aminoácidos libres	4.5 % p/p
Aminograma: Glu, Ala, Asp, Thr, Leu, Gly, Arg, Val, Tyr, Lys, Ser, His, Met, Iso, Phe y Pro.	
Aminoácidos procedentes de hidrólisis de proteínas vegetales.	
Hierro (Fe) soluble en agua	5.0 % p/p
Materia orgánica total procedente del extracto de algas (<i>Ascophyllum nodosum</i>)	20.0 % p/p

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto.....	líquido
Color	marrón
pH.....	3.0 ± 1.0
Densidad.....	1.24 ± 0.05 g/cm ³

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicación vía foliar:

Cultivo	Dosis (L/Ha)	Época de aplicación
Chile, Jitomate, Tabaco, Papa, Berenjena, Tomate de cascara, Pimiento, Melón, Pepino, Sandía, Calabacita, Chayote, Sing gua, Opo squash, Winter melón, Bitter melón, Mokwa, Calabaza, Cebolla, Poro, Cebollín, leek, Ajo, Apio, Cilantro, Perejil, Coliflor, Brócoli, Gai choy, Yu choy, Bok choy, Choy, napa, rábano, Daikon, Col de Bruselas, Kale, kai-lan/gai lan, Mostaza, colza, Colinabo, Kohlrabi, nabo, Betabel, Acelga, Espinaca, Amaranto, Chard, Esparrago, Zanahoria, Lechuga, Manzaniella Alcachofa, Jengibre, Camote, Menta, Chía, albahaca, Okra. Ornamentales: Gerbera, Gladiolo, Lily, Clavel, Rosa, Crisantemo, Nochebuena, Tulipán, Geranio, Dalia, Alcatraz, Azalea, Begonia, Jacinto, Zempoalxochitl, Nube Nardo, Stalice, Alhelí, Ave del paraíso, Agapando.	2.0 – 4.0	Realizar 2 aplicaciones durante las etapas de floración y cuajado de fruto.
Fresa, Zarzamora, Mora, Durazno, Peral, Frambuesa, Chabacano, Ciruelo, Manzana, Almendro, Tejocote, Membrillo, Cereza, Grosella, Lima, Naranja, Mandarina, Limón, Toronja, Pomelo, Cidro, Tangerino, Mango, Marañón, pistache, coco, dátil, palma de aceite o palma africana, Piña, Papaya, Arándano, Nogal, Nogal pecanero, Nuez de Macadamia, Aguacate, Canela, Laurel, Algodón, Okra, Cacao, Banano, Guayaba, Carambolo, Maracuyá, Café, Litchi, Rambután, Vid/uva, Higo, Jaca, Mamey, Zapote negro, Zapote blanco, Chicozapote, Caimito, Granada, Yuca, Olivo, Tamarindo, Guanábana, Agave, Castaño, Kiwi, Avellano, Nopal, Pitahaya, Tuna, Xoconostle, Pitaya y Vainilla.	2 - 4	Realizar 2 aplicaciones durante las etapas de prefloración y cuajado de fruto.
Girasol, Cártamo, Linaza, Ajonjolí, Alfalfa, Lenteja, Haba, Garbanzo, Ejote, Frijol, Chicharo, Cacahuete, Soya, Jícama, Alubia, Long vean, Maíz, Sorgo, Avena, Centeno, Arroz, Cebada, Caña de azúcar, Trigo, Triticale, Amaranto, Canola		

www.idainature.com



IDAI NATURE AMERICA, S.A. DE C.V. / Av. Kiki Murillo# 101-27B, Zona Comercial del Desarrollo, La Primavera Culiacán, Sinaloa, C.P. 80300. Tel. +521 (667) 744 08 24

Versión: 05

Fecha de revisión: 22/06/2021



Aplicación al suelo:

Cultivo	Dosis (L/Ha)	Época de aplicación
Chile, Jitomate, Tabaco, Papa, Berenjena, Tomate de cascara, Pimiento, Melón, Pepino, Sandía, Calabacita, Chayote, Sing gua, Opo squash, Winter melón, Bitter melón, Mokwa, Calabaza, Cebolla, Poro, Cebollín, leek, Ajo, Apio, Cilantro, Perejil, Coliflor, Brócoli, Gai choy, Yu choy, Bok choy, Choy, napa, rábano, Daikon, Col de Bruselas, Kale, kai-lan/gai lan, Mostaza, colza, Colinabo, Kohlrabi, nabo, Betabel, Acelga, Espinaca, Amaranto, Chard, Esparrago, Zanahoria, Lechuga, Manzanilla, Alcachofa, Jengibre, Camote, Menta, Chía, albahaca, Okra. Ornamentales: Gerbera, Gladiolo, Lily, Clavel, Rosa, Crisantemo, Nochebuena, Tulipán, Geranio, Dalia, Alcatraz, Azalea, Begonia, Jacinto, Zempoalxochitl, nube Nardo, Stative, Alhelí, ave del paraíso, agapando.	2.0 – 4.0	Realizar 2 aplicaciones durante las etapas de prefloración, floración y cuajado de fruto.
Fresa, Zorzamora, Mora, Durazno, Peral, Frambuesa, Chabacano, Ciruelo, Manzana, Almendro, Tejocote, Membrillo, Cereza, Grosella, Lima, Naranja, Mandarina, Limón, Toronja, Pomelo, Cidro, Tangerino, Mango, Marañón, pistache, coco, dátil, palma de aceite o palma africana, Piña, Papaya, Arándano, Nogal, Nogal pecanero, Nuez de Macadamia, Aguacate, Canela, Laurel, Algodón, Okra, Cacao, Banano, Guayaba, Carambolo, Maracuyá, Café, Litchi, Rambután, Vid/uva, Higo, Jaca, Mamey, Zapote negro, Zapote blanco, Chicozapote, Caimito, Granada, Yuca, Olivo, Tamarindo, Guanábana, Agave, Castaño, Kiwi, Avellano, Nopal, Pitahaya, Tuna, Xoconostle, Pitaya y Vainilla.	2.0 – 4.0	Realizar 2 aplicaciones durante las etapas de prefloración y cuajado de fruto.
Girasol, Cártamo, Linaza, Ajonjoli, Alfalfa, Lenteja, Haba, Garbanzo, Ejote, Frijol, Chícharo, Cacahuete, Soya, Jícama, Alubia, Long vean, Maíz, Sorgo, Avena, Centeno, Arroz, Cebada, Caña de azúcar, Trigo, Triticale, Amaranto, Canola	2.0 – 4.0	Realizar 2 aplicaciones durante las etapas de prefloración y cuajado de fruto.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Envasado: Botellas de 1 L (cajas 12 x 1L), garrafa de 5 L (cajas 4 x 5L) y garrafas 20 L, bidones de 200 L y contenedores de 1000 L.

Leer bien la etiqueta antes de aplicar el producto, en ellas se detallan las especificaciones técnicas del producto, tales como riquezas garantizadas, propiedades, dosis y modo de empleo, aplicaciones y cultivos, registro, precauciones, normas de almacenamiento, incompatibilidades y notas del fabricante.

Registro Sanitario nº RSCO-152/V/21

www.idainature.com



IDAI NATURE AMERICA, S.A. DE C.V. / Av. Kiki Murillo# 101-27B, Zona Comercial del Desarrollo, La Primavera Culiacán, Sinaloa, C.P. 80300. Tel. +521 (667) 744 08 24

Versión: 05

Fecha de revisión: 22/06/2021

