



# Arдын® | LÍQUIDO EMULSIONABLE

## FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	
<b>Jasmonatos (Cisjamone)</b> (equivalente a 6.5 g de i.a./L a 20°C)	0.50
<b>Chitosan (polvo de conchas de crustáceos)</b> (equivalente a 26 g de i.a./L a 20°C)	2.00
<b>INGREDIENTES INERTES</b> Acondicionadores, Estabilizadores, Surfactante, Emulsificante, Coadyuvante y Diluyente	97.50
<b>TOTAL</b>	100.00

RSCO-FUNG-0301H-0474-096-2.50

OMRI anm-18713

**ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL.**

### MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Agite perfectamente el producto, abra con cuidado el envase, mida con una probeta de plástico o algún otro utensilio graduado específico para este uso la cantidad indicada de Arдын® y viértala en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión y agite nuevamente.

Arдын® es un líquido emulsionable, útil para el control de la enfermedad aquí indicada:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Pepino Calabacita Sandía Melón (0)	Mildiu polvoriento ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	1.25 - 1.50	Realizar 3 aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 y 11 días después de la primera aplicación. Volumen de aplicación 180-280 L de agua/ha.

**( ): Intervalo de seguridad:** días entre la última aplicación y la cosecha

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** Una vez que la aspersión se ha secado.