



Burhan® | LÍQUIDO EMULSIONABLE

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTES ACTIVOS	
Bacillus spp (con un contenido de no menos de 1X10⁸ UFC/mL) (equivalente a 500 g de i.a./L a 20°C)	50.00
Aceite de clavo (<i>Syzygium aromaticum</i>) (equivalente a 25 g de i.a./L a 20°C)	2.50
Aceite de neem (<i>Azadirachta indica</i>) (equivalente a 25 g de i.a./L a 20°C)	2.50
INGREDIENTES INERTES Emulsificante, Acondicionadores y Diluyentes	45.00
TOTAL	100.00

RSCO-MEZC-FUNG-1304-X0017-096-055

OMRI. anm-18819

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PUEDO SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN, PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL.

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN.

Agite perfectamente el producto; para abrir el envase, gire la tapa hasta romper el arillo de plástico, retiré cuidadosamente el sello de seguridad colocado en la parte superior del envase. Mida con una probeta de plástico o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad indicada de BURHAN y viértala en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión y agite nuevamente.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Cafeto (0)	Roya del café (<i>Hemileia vastatrix</i> L.)	1.0-1.5	Realizar cuatro aplicaciones al follaje a intervalo de 14 días. Utilizar la dosis recomendada en 1250-1350 L de agua/ha

(0): Intervalo de seguridad: días entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: Una vez que la aspersión se ha secado.